



Problemă	Soluție
Făinare - <i>Podosphaera leucotricha</i>	Kumulus® DF 4,5 kg/ha
Rapăn - <i>Venturia inaequalis</i>	Polyram® DF 2,5 kg/ha Scala® 0,75 - 1 l/ha
Rapăn - <i>Venturia inaequalis</i> + Făinare - <i>Podosphaera leucotricha</i>	Delan® Pro 2,5 l/ha Sercadis® 0,25 - 0,3 l/ha Revyona® 1,3 l/10.000 m ² suprafața peretelui foliar Dagonis® 1,2 l/ha (rapăn); 0,72 l/ha (făinare)
Boli de depozitare	Bellis® 0,8 kg/ha
Regulator de creștere, Focul bacterian - <i>Erwinia amylovora</i>	Regalis® Plus 2,5 - 3 kg/ha AgCelence Directorul de apărare
	Urechiușe de șoarece Muguri florali vizibili Buton roz Înflorit Scuturarea petalelor Fruct 20 mm Fruct 30-40 mm Fruct ½ din mărime normală Coacere Căderea frunzelor

*Pentru a evita apariția formelor de rezistență în combaterea rapănului: Sercadis® - 0,25 l/ha, împreună cu un fungicid care are și acțiune de contact, de ex. Delan® Pro sau Polyram® DF.

Timp de pauză până la recoltat:

Polyram® DF - 21 zile | Delan® Pro - 35 zile | Sercadis® - 35 zile | Dagonis® - 35 zile
Scala® - 7 zile | Bellis® - 7 zile | Revyona® - 28 zile