

**Date tehnice**

Substanță activă: 500 g/l metazaclor
Formulare: Suspensie concentrată
Număr certificat omologare: 238PC/20.10.2016
Ambalaj: 5 L

**Caracteristici și mod de acțiune**

Butisan® S este un erbicid cu acțiune reziduală la sol pe bază de metazaclor, din clasa cloracetanilide. Produsul este preluat prin cotiledoane și rădăcini și are eficacitate maximă înainte sau imediat după răsărirea buruienilor.

Pentru obținerea unor rezultate optime este necesară aplicarea produsului pe un pat germinativ foarte bine pregătit, mărunțit, neted și umed.

Buruienile sensibile sunt buruienile dicotiledonate și monocotiledonate, cum ar fi: *Polygonum convolvulus*, *Apera spica-venti*, *Alopecurus myosuroides*, *Anthemis arvensis*, *Stellaria media*, *Galium aparine*, *Amaranthus retroflexus*, *Lamium spp.*, *Chenopodium album*, *Myosotis arvensis*, *Senecio vulgaris*, *Matricaria spp.*, *Poa annua*, *Solanum nigrum*, *Aphanes arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Capsella bursa-pastoris*, *Sonchus arvensis*, *Veronica spp.*, etc.

**Modul de folosire**

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Rapița de toamnă și rapița de primăvară	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	1,5 l/ha
Varza de Bruxelles (semănată direct sau transplantată)	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	1,5 l/ha
Arbori și arbuști ornamentali	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	1,5 l/ha



Recomandări

Rapița de toamnă sau rapița de primăvară - produsul poate fi aplicat preemergent sau postemergent timpuriu în funcție de tipul de sol, de pregătirea patului germinativ și de spectrul de buruieni.

Utilizarea în preemergență este recomandată astfel: pe solurile medii și grele, unde patul germinativ este umed, bine pregătit și lipsit de bulgări, produsul poate fi aplicat de la semănat până la răsărirea culturii de rapiță.

În perioadele cu temperaturi mai ridicate, momentul aplicării produsului poate fi până la 48 de ore de la semănat.

A nu se aplica produsul de la momentul răsării până când cultura de rapiță are stadiul de două cotiledoane complet dezvoltate.

Utilizarea în postemergență timpurie este recomandată astfel: produsul poate fi aplicat pe solurile ușoare, medii și grele începând cu stadiul în care cea mai mare parte a culturii se află la stadiul de cotiledoane complet dezvoltate până la stadiul de vegetație de 9 frunze adevărate ale culturii (BBCH 19). Buruienile trebuie să fie nerăsărite sau să nu depășească stadiul de 1-3 frunze adevărate.



Avantaje

- Erbicid standard la cultura de rapiță.
- Utilizare ușoară.
- Selectivitate excelentă.



Cultura

