

**Date tehnice**

Substanță activă: 250 g/l quinmerac + 35 g/l imazamox
Formulare: Suspensie concentrată
Număr certificat omologare: 107PC/22.07.2015
Ambalaj: 5 L

**Caracteristici și mod de acțiune**

Cleravo® este un erbicid care acționează în principal ca erbicid foliar (postemergent), utilizat doar pentru hibridii de rapiță Clearfield®. Produsul conține imazamox și quinmerac. Imazamox este absorbit de buruieni prin rădăcină și frunze, după care este translocat în întreaga plantă. Creșterea buruienilor sensibile este inhibată imediat după aplicare. Imazamox inhibă enzima acetolactat-sintetază (ALS), fapt ce duce la inhibarea sintezei aminoacizilor și apoi la moartea buruienilor sensibile. Cea de-a doua substanță activă, quinmerac, este preluată de asemenea, prin

rădăcină și frunze și este translocată atât acro, cât și bazipetal. Modul de acțiune este similar cu cel al sintezei auxinelor.

Erbicidul combate un spectru larg de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate. Dintre acestea amintim: *Anthemis spp.*, *Brassica napus*, *Capsela bursa - pastoris*, *Descuriana sophia*, *Chenopodium spp.*, *Galium aparine*, *Matricaria spp.*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum spp.*, *Stellaria media*, *Veronica spp.*, *Sinapis arvensis*, *Viola arvensis*, samulastră, etc.

**Modul de folosire**

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Rapiță de toamnă hibridi Clearfield®, (aplicare primăvară)	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	0,8 - 1 l/ha cu adjuvant Dash® HC 1 l/ha Postemergent aplicat primăvara.
Rapiță de primăvară hibridi Clearfield®	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	0,8 - 1 l/ha cu sau fără adjuvant Dash® HC 1l/ha Postemergent aplicat primăvara.
Rapiță de toamnă hibridi Clearfield® (aplicare toamnă)	Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate	0,8 - 1 l/ha cu sau fără adjuvant Dash® HC 1l/ha Postemergent aplicat toamna.

**Recomandări**

Pentru rapița de toamnă produsul se poate aplica toamna sau primăvara. În sezonul de toamnă, Cleravo® se aplică când rapița are 2-8 frunze (BBCH 10-18). Aplicarea în primăvară se face după pornirea vegetației, când plantele de rapiță se află la începutul elongării tulpinii (faza de rozetă) și până la apariția primilor boboci florali (BBCH 30-50). Pentru rapița de primăvară aplicarea se face când rapița are 2-8 frunze (BBCH 10-18). Produsul Cleravo® se aplică în amestec cu adjuvantul Dash® HC în doză de 1l/ha. O atenție deosebită se va acorda stadiului buruienilor, momentul optim

fiind atunci când buruienile dicotile se află în stadiul mic de 2-4 frunze, iar cele monocotile înainte de înfrățire. Pentru combaterea samulastrei de cereale la rapița de toamnă se recomandă a se efectua în toamnă un tratament cu un erbicid graminicid omologat, având în vedere că în primăvară stadiul de dezvoltare al samulastrei este mare și nu poate fi combătută satisfăcător cu Cleravo®. Erbicidul se aplică numai la cultura de rapiță cu hibridi tip Clearfield®. Nu se aplică la hibridii convenționali de rapiță.

.....
 Pentru bune practici de utilizare a sistemului Clearfield® la cultura de rapiță vezi pag. 242

**Avantaje**

- Soluția Clearfield® de erbicidare în toamnă sau primăvară a culturii de rapiță.
- Combaterea buruienilor dicotile dificile, inclusiv a celor crucifere.
- Flexibilitate în aplicare.

**Cultura**