



Date tehnice

Substanță activă: 100 g/l cicloxidim
Formulare: Concentrat emulsionabil
Număr certificat omologare: 1372/21.12.1992
Ambalaj: 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Stratos® Ultra este un erbicid pe bază de cicloxidim. Produsul are o acțiune sistemică și este absorbit prin părțile verzi ale buruienilor. Substanța activă pătrunde în plante la 1-2 ore de la aplicare, migrează ascendent și descendent, inclusiv pe toată lungimea rizomilor și se interpune în procesul formării țesuturilor meristemice. Primele simptome, de stopare a creșterii și de apariție a culorii antocianice, sunt vizibile la câteva zile după aplicare.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
Fasole de câmp	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
Tomate	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-29)
	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-29)
Lucernă pentru producția de semințe	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-51)

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Soia, floarea-soarelui	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-51)
	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-19)
Rapiță pentru ulei (toamnă, primăvară)	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-19)
	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-32)
Porumb (hibridi rezistenți tip CTM)	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-32)
	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-19)
Cartof	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-19)
	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
Pomi fructiferi	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică în perioada de vegetație
Căpșun	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică în perioada de vegetație
	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - 2L/ha (singur) sau 1L/ha + 1L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-16)
	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (singur) sau 2L/ha + 2L/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-16)



Tehnica de aplicare

Stratos® Ultra este un erbicid cu aplicare în postemergență. Pentru combaterea buruienilor graminee anuale și a costreului din semințe, erbicidarea se face în faza de 3-4 frunze a buruienilor.

Pentru buruienile graminee perene (din rizomi) aplicarea se face când acestea au suficientă masă vegetativă (15-20 cm înălțime). Este de preferat ca erbicidarea să se facă după o ploaie sau după irigare, în orele târzii ale după amiezii.



Recomandări

Lucernă pentru producția de semințe - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 11 – 51.

Fasole de câmp - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 39.

Sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 39, respectiv de la 2 frunze până când frunzele se dezvoltă și acoperă 90% din suprafața solului.

Porumb, floarea-soarelui - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 19, respectiv de la 2 la 9 frunze. La porumb se aplică numai în culturile cu hibridi CTM.

Soia - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 19.

Rapiță pentru ulei - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 32, respectiv de la 2 frunze până la apariția celui de-al 2-lea internod vizibil, produsul combate inclusiv samulastra de grâu și orz.

Tomate - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12-29, respectiv de la 2 frunze până la 9 ramificații vizibile.

Căpșun - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 11-16, respectiv de la 1 până la 6 frunze.

Pomi fructiferi - se aplică pe parcursul sezonului.

Cartof - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 – 39, de la 2 frunze până când acestea se dezvoltă și acoperă 90% din suprafața solului.

Țimp de pauză: fasole, soia, cartof – 56 zile; pomi fructiferi – 28 zile; căpșun – 42 zile, tomate – 28 zile.

Număr maxim de tratamente: 1 tratament.



Avantaje

- Combaterea perfectă a buruienilor monocotiledonate, chiar și când există un grad ridicat de infestare.
- Tratamentul este eficace din prima săptămână după aplicare, când are loc stoparea creșterii rădăcinilor buruienilor.
- Flexibilitate mare de aplicare de la stadiul de 2 până la 8 frunze ale culturii de porumb.
- Selectivitate foarte bună pentru cultura de porumb pentru hibridii tip CTM.



Cultura

