



Stratos® Ultra 100 g/l cicloxidim



Date tehnice

Formulare: Concentrat emulsionabil
Număr certificat omologare: 1372/21.12.1992
Ambalaj: 5 l



Caracteristici și mod de acțiune

Stratos® Ultra este un erbicid care conține substanța activă cicloxidim. Combate buruienile graminee anuale și perene. Stratos® Ultra are o acțiune sistemică și este absorbit prin părțile verzi ale buruienilor. După aplicare, produsul pătrunde în plante (buruieni) în 1-2 ore, migrează ascendent și descendent, inclusiv pe toată lungimea rizomilor, și se interpune în procesul formării țesuturilor meristemice. Primele simptome – de stopare a creșterii și de apariție a culorii antocianice - sunt vizibile la câteva zile de la aplicare.



Modul de folosire

Cultura	Spectrul de combatere	Doză
Fasole de câmp	Buruieni monocotiledonate anuale	1 l/ha - 2 l/ha (singur) sau 1 l/ha + 1 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
	Buruieni monocotiledonate perene	4 l/ha (singur) sau 2 l/ha + 2 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
Tomate	Buruieni monocotiledonate anuale	1 l/ha - 2 l/ha (singur) sau 1 l/ha + 1 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-29)
	Buruieni monocotiledonate perene	4 l/ha (singur) sau 2 l/ha + 2 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-29)
Pomi fructiferi	Buruieni monocotiledonate anuale	1 l/ha - 2 l/ha (singur) sau 1 l/ha + 1 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică în perioada de vegetație
	Buruieni monocotiledonate perene	4 l/ha (singur) sau 2 l/ha + 2 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică în perioada de vegetație
Căpșun	Buruieni monocotiledonate anuale	1 l/ha - 2 l/ha (singur) sau 1 l/ha + 1 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-16)

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Cartof	Buruieni monocotiledonate perene	4 l/ha (singur) sau 2 l/ha + 2 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 11-16)
	Buruieni monocotiledonate anuale	1 l/ha - 2 l/ha (singur) sau 1 l/ha + 1 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)
	Buruieni monocotiledonate perene	4 l/ha (singur) sau 2 l/ha + 2 l/ha adjuvant (Dash® HC) Se aplică postemergent (BBCH 12-39)

*pentru alte culturi consultați eticheta produsului.



Aplicare / momentul aplicării

Este de preferat ca erbicidarea să se facă după o ploaie, sau după irigare, în orele târzii ale după-amiezii.

Tomate - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12-29, respectiv de la 2 frunze până la 9 ramificații vizibile.

Fasole de câmp - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 - 39.

Căpșun - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 11-16, respectiv de la 1 până la 6 frunze.

Cartof - se aplică postemergent, maxim 1 tratament, pe perioada de vegetație BBCH 12 - 39, de la 2 frunze până când acestea se dezvoltă și acoperă 90% din suprafața solului.

Pomi fructiferi - se aplică pe parcursul sezonului, 1 tratament pe sezon.

Timp de pauză: fasole, cartof - 56 zile; pomi fructiferi - 28 zile; căpșun - 42 zile, tomate - 28 zile.

Volum de apă: Se recomandă utilizarea unui volum de soluție de 100-400 l/ha, în funcție de cultură și echipament.



Avantaje

- Tratamentul este eficient din prima săptămână după aplicare, când are loc stoparea creșterii rădăcinilor buruienilor.
- Combaterea eficientă a buruienilor graminee, chiar și în condiții de infestare ridicată.
- Selectivitate pentru plantele de cultură.
- Flexibilitate în aplicare, în funcție de spectrul de buruieni.