



Date tehnice

Substanță activă: 200 g/l dimoxistrobin + 200 g/l boscalid
Formulare: Suspensie concentrată
Număr certificat omologare: 2710/11.06.2007
Ambalaj: 1 L, 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Pictor® este un fungicid pe bază de două substanțe active: boscalid din grupa carboximide și dimoxistrobin din clasa strobilurinelor, cu o acțiune sinergică.

Pictor® are o acțiune sistemică și translaminară. După penetrarea prin suprafața frunzei, ambele substanțe active sunt translocate acropetal în interiorul plantei.

Ambele substanțe active au acțiune secundară fiziologică.

Pictor® are acțiune preventivă, curativă și eradicativă, împiedică germinarea sporilor și creșterea miceliului ciupercilor, cu efect asupra dezvoltării tuburilor germinative și sporulării.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Floarea soarelui	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Putregaiul alb	0,5 l/ha
	<i>Botrytis cinerea</i>	Putregaiul cenușiu	(2 tratamente)
	<i>Phomopsis helianthi</i>	Pătarea brună și frângerea tulpinilor	în vegetație)
	<i>Alternaria spp.</i>	Alternarioza	
Rapiță	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Putregaiul alb	0,5 l/ha
	<i>Botrytis cinerea</i>	Putregaiul cenușiu	
	<i>Phoma lingam</i>	Putregaiul negru	
	<i>Alternaria brassicae</i>	Alternarioza	
	<i>Erysiphe cruciferarum</i>	Făinarea	



Tehnica de aplicare

Timp de pauză: Rapiță pentru ulei - 30 de zile.



Recomandări

Pictor® se aplică într-un program preventiv. La floarea-soarelui, în funcție de boala țintă, tratamentele se aplică de la stadiul de 10

frunze până la înflorit deplin BBCH 20-65 (maxim 2 tratamente), iar la rapiță de la faza de buton galben până la înflorit total BBCH 59-65 (maxim 1 tratament).



Avantaje

- Control excelent al bolilor.
- Reducerea efectelor stresului cauzat de secetă, temperaturi scăzute, atac de boli sau insecte.
- Reducerea dehiscentei premature, reducerea pierderilor înainte de recoltare.
- Recoltă mărită și de calitate.



Cultura



Pictor® - cea mai bună combatere a putregaiului alb - *Sclerotinia sclerotiorum*

Putregaiul alb este o boală extrem de păgubitoare pentru culturile de floarea-soarelui și rapiță. Pentru combaterea acestei boli trebuie luate o serie de măsuri agro-fitotehnice și chimice. Prin dubla sa acțiune, determinată de cele două substanțe active ale produsului (dimoxistrobin și boscalid), fungicidul

Pictor® este unul dintre cele mai eficiente produse pentru combaterea putregaiului alb. În plus, boscalid - care aparține grupei de substanțe numite "antibotritice" - este specifică pentru combaterea putregaiurilor: putregaiul alb, putregaiul cenușiu, s.a.