



### Date tehnice

**Substanță activă:** ..... 200 g/l dimoxistrobin + 200 g/l boscalid  
**Formulare:** ..... Suspensie concentrată  
**Număr certificat omologare:** ..... 2710/11.06.2007  
**Ambalaj:** ..... 1 L, 5 L



### Caracteristici și mod de acțiune

Pictor® este un fungicid pe bază de două substanțe active: boscalid din grupa carboximide și dimoxistrobin din clasa strobilurinelor, cu o acțiune sinergică.

Pictor® are o acțiune sistemică și translaminară. După penetrarea prin suprafața frunzei, ambele substanțe active sunt translocate acropetal în interiorul plantei.

Ambele substanțe active au acțiune secundară fiziologică.

Pictor® are acțiune preventivă, curativă și eradicativă, împiedică germinarea sporilor și creșterea miceliului ciupercilor, cu efect asupra dezvoltării tuburilor germinative și sporulării.



### Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Floarea soarelui	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Putregaiul alb	0,5 l/ha
	<i>Botrytis cinerea</i>	Putregaiul cenușiu	(2 tratamente)
	<i>Phomopsis helianthi</i>	Pătarea brună și frângerea tulpinilor	în vegetație)
	<i>Alternaria spp.</i>	Alternarioza	
Rapiță pentru ulei	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Putregaiul alb	0,5 l/ha
	<i>Botrytis cinerea</i>	Putregaiul cenușiu	
	<i>Phoma lingam</i>	Putregaiul negru	
	<i>Alternaria brassicae</i>	Alternarioza	
	<i>Erysiphe communis</i>	Făinarea	



### Recomandări

Pictor® se aplică într-un program preventiv. La floarea-soarelui, în funcție de boala țintă, tratamentele se aplică de la stadiul de 10

frunze până la înflorit deplin BBCH 20-65 (maxim 2 tratamente), iar la rapiță de la faza de buton galben până la înflorit total BBCH 59-65 (maxim 1 tratament).



### Tehnica de aplicare

**Timp de pauză:** Rapiță pentru ulei - 30 de zile.



### Avantaje

- Control excelent al bolilor.
- Reducerea efectelor stresului cauzat de secetă, temperaturi scăzute, atac de boli sau insecte.
- Reducerea dehiscentei premature, reducerea pierderilor înainte de recoltare.
- Recoltă mărită și de calitate.



### Cultura



### Pictor® - cea mai bună combatere a putregaiului alb - *Sclerotinia sclerotiorum*

Putregaiul alb este o boală extrem de păgubitoare pentru culturile de floarea-soarelui și rapiță. Pentru combaterea acestei boli trebuie luate o serie de măsuri agro-fitotehnice și chimice. Prin dubla sa acțiune, determinată de cele două substanțe active ale produsului (dimoxistrobin și boscalid), fungicidul

Pictor® este unul dintre cele mai eficiente produse pentru combaterea putregaiului alb. În plus, boscalid - care aparține grupei de substanțe numite "antibotritice" - este specifică pentru combaterea putregaiurilor: putregaiul alb, putregaiul cenușiu, s.a.