

Polyram® DF

70% metiram



Date tehnice

Formulare: Granule dispersabile în apă
Număr certificat omologare: 1369/21.12.1992
Ambalaj: 10 kg



Caracteristici și mod de acțiune

Polyram® DF este un fungicid cu acțiune preventivă și efect multi-site, conținând substanța activă metiram, din grupa ditiocarbamaților. Polyram® DF are acțiune de contact, împiedică germinarea

sporilor ciupercilor, având însă efect și asupra dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. Are spectru larg de combatere a bolilor. Acțiunea sa inițială este foarte rapidă.



Modul de folosire

Cultura	Spectrul de combatere	Doză
Viță de vie	Mana (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,2%
Cartof	Mana (<i>Phytophthora infestans</i>)	1,8 kg/ha
	Alternarioza (<i>Alternaria solani</i>)	
Ceapă	Mana (<i>Peronospora destructor</i>)	0,2%
Castraveți	Mana (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,2%
Tomate	Mana (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,2%
	Pătarea albă (<i>Septoria lycopersici</i>)	
	Pătarea cafenie (<i>Cladosporium fulvum</i>)	
	Alternarioza (<i>Alternaria solani</i>)	
Măr, păr	Rapănul (<i>Venturia spp.</i>)	0,25%
Flori (garoafe)	Rugină (<i>Uromyces caryophyllinus</i>)	0,3 %



Aplicare / momentul aplicării

Viță de vie - Se recomandă integrarea în programul de combatere, în cadrul tratamentelor de contact acuprice. Astfel, poate fi aplicat la începutul perioadei de vegetație, la primele tratamente cu produse de contact (creșterea lăstarului sau la răsfirarea inflorescenței).

Cartof, ceapă, castraveți, tomate - Polyram® DF fiind un fungicid de contact, tratamentele trebuie făcute preventiv. În funcție de evoluția condițiilor climatice și de evoluția bolii, tratamentele se

repetă la un interval de maxim 10-14 zile, iar dacă este cazul la intervale mai scurte, adaptabil, în funcție de condițiile climatice și de evoluția culturii.

Timp de pauză: Măr, păr - 21 zile; Tomate - 7-14 zile; Cartofi - 14 zile; Viță de vie - 56 zile; Ceapă - 7 zile; Castraveți - 3 zile.

Volumul de apă: cartof și castraveți 600-800 l/ha, tomate 800- 1000 l/ha, măr 500-1500 l/ha, păr 500-1000 l/ha, viță de vie și flori 1000 l/ha.



Avantaje

- Produs cu acțiune rapidă și efect multi-site.
- Excelentă formulare a produsului, care determină o mai mare eficacitate în combaterea bolilor.
- Bună aderență la suprafața frunzelor.
- Risc foarte scăzut de apariție a rezistenței.
- Specific pentru tratamentele cu produsele acuprice de contact la cultura de viță de vie.

