



Date tehnice

Substanță activă: 150 g/l piraclostrobin + 75 g/l fluxapiroxad
Formulare: Concentrat emulsionabil
Număr certificat omologare: 273PC/28.02.2017
Ambalaj: 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Produsul Priaxor® EC conține două substanțe active, piraclostrobin din clasa strobilurinelor și fluxapiroxad din grupul inhibitori ai succinat dehidrogenazei (SDHI).

Substanța activă, piraclostrobin are în principal acțiune preventivă, inhibă germinația sporilor și controlează creșterea miceliului și sporularea. Piraclostrobin are o mișcare translaminară și local sistemică.

Substanța activă fluxapiroxad are excelente proprietăți preventive și curative, inhibă puternic germinația sporilor, alungirea tubului germinativ, creșterea miceliului și sporularea (toate stadiile majore de dezvoltare a bolilor).

Combinăția celor două substanțe active oferă control asupra unui spectru larg de boli foliare și aduce un beneficiu împotriva managementului rezistenței.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Grâu de toamnă	<i>Erysiphe graminis</i>	Făinare	0,75 - 1 l/ha
Grâu de primăvară	<i>Septoria tritici</i>	Septorioza	
Grâu durum	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	Patarea reticulară a frunzelor	
Grâu spelta	<i>Puccinia recondita</i>	Rugina brună	
Triticale	<i>Erysiphe graminis</i>	Făinare	0,75 - 1 l/ha
	<i>Septoria spp.</i>	Septorioza	
	<i>Puccinia recondita</i>	Rugina brună	
Orz de toamnă, orz de primăvară	<i>Erysiphe graminis</i>	Făinare	0,75 - 1 l/ha
	<i>Rhynchosporium secalis</i>	Arsura frunzelor	
	<i>Pyrenophora teres</i>	Pătarea brună a frunzelor	
	<i>Puccinia hordei</i>	Rugina orzului	
Secară	<i>Puccinia recondita</i>	Rugina brună	0,75 - 1 l/ha
	<i>Rhynchosporium secalis</i>	Arsura frunzelor	



Recomandări

Produsul se utilizează la culturile de cereale păioase, respectiv la grâu de toamnă, grâu de primăvară, grâu durum, grâu spelta, triticale, orz de toamnă, orz de primăvară, secară, maxim 2 tratamente, la un interval de 21 de zile între ele, în perioada de vegetație BBCH 25-61/69, respectiv de la mijlocul înfrățitului și până la sfârșitul înfloritului.

Priaxor® EC este un produs de ultimă generație în domeniul fungicidelor pentru cereale. Pe lângă beneficiile pe care Priaxor® EC le aduce din punct de vedere fitopatologic, produsul vine în sprijinul fermierului cu beneficii suplimentare pentru un management mai eficient al culturii.

Datorită proprietăților diverse pe care le are în

controlul unui spectru larg de boli, atât curativ, cât și preventiv, fermierul își poate alege perioada de aplicare a produsului în funcție de nevoile specifice.

Atunci când ne confruntăm cu o presiune mare a bolilor la ieșirea din iarnă și trebuie să acționăm pentru a nu perturba buna dezvoltare a plantelor sau avem parte de o perioadă caldă, cu umiditate crescută, când potențialul dezvoltării patogenilor crește – Priaxor® EC este întotdeauna cea mai bună alegere și asigură rezolvarea oricărei probleme pe care o are fermierul în controlul bolilor la orz și grâu. Priaxor® EC are o selectivitate excelentă și nu prezintă niciun risc față de culturile de cereale.

Priaxor® EC are o miscibilitate foarte bună și poate fi amestecat cu majoritatea produselor de pe piață, cu condiția verificării compatibilității amestecurilor înainte de aplicare.



Tehnica de aplicare

Timp de pauză: 35 de zile



Avantaje

- Control excelent al bolilor pentru producții ridicate și de calitate.
- Flexibilitate în aplicare pentru un management optim și ușor în fermă.
- Protecție sigură a plantelor prin modul sinergic de acțiune a substanțelor active, eficacitatea rapidă, de lungă durată și prin beneficiile AgCelence®.



Cultura

