



Date tehnice

Substanță activă: 200 g/l piraclostrobin
Formulare: Concentrat emulsionabil
Număr certificat omologare: 184PC/03.06.2016
Ambalaj: 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Retengo® este un produs fungicid cu acțiune în principal protectivă, și parțial curativă și eradicativă pentru controlul bolilor specifice culturilor de grâu, orz, secară, triticale, porumb și floarea-soarelui. Piraclostrobinul este o strobilurină cu acțiune translaminară și sistemie locală, ce inhibă germinația sporilor și controlează creșterea micelului și sporularea.

De asemenea, efectele fiziologice dovedite conduc la îmbunătățirea fotosintezei, utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor, creșterea rezistenței plantelor la stres și la arsurile solare precum și la secetă, mai puține frunze îmbătrânite, tulpini mai rezistente la frângere. Retengo® oferă o protecție de aproximativ 21 de zile.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Floarea soarelui	<i>Alternaria helianthi</i>	Alternarioza	0,5 - 1 l/ha
	<i>Diaporthe helianthi</i>	Pătarea brună și frângerea tulpinilor	
	<i>Phoma macdonaldii</i>	Pătarea neagră	
	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Putregaiul alb	
Porumb	<i>Cochliobolus carbonum</i>	Pătarea cărbunoasă a frunzelor	0,7 - 1 l/ha
	<i>Exserohilum turcicum</i>	Pătarea cenușie a frunzelor (helmintosporioza)	
	<i>Kabatiella zae</i>	Pătarea în ochi a frunzelor de porumb	
	<i>Puccinia sorghi</i>	Rugina porumbului	
Grâu de toamnă, grâu de primăvară, grâu durum și spelta (alac)	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	Pătarea oculară	0,8 - 1,25 l/ha
	<i>Puccinia recondita</i>	Rugina brună	
	<i>Puccinia striiformis</i>	Rugina galbenă	

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Orz de toamnă, orz de primăvară	<i>Puccinia hordei</i>	Rugina brună (pitica)	0,8 - 1,25 l/ha
	<i>Rhynchosporium secalis</i>	Arsura frunzelor	
	<i>Pyrenophora teres</i>	Pătarea reticulară brună a frunzelor (Helmintosporioza)	
Secara	<i>Rhynchosporium secalis</i>	Arsura frunzelor	0,8 - 1,25 l/ha
	<i>Puccinia recondita</i>	Rugina brună	
Triticale	<i>Puccinia recondita</i>	Rugina brună	0,8 - 1,25 l/ha



Recomandări

Pentru **cultura de floarea-soarelui** se recomandă a se aplica de la stadiul de 6 frunze până la stadiul de stea (capitul 2-3 cm diametru). În cazul în care se aplică o tehnologie cu două tratamente pe sezon, primul tratament se recomandă a se face cu Retengo®, urmat de produsul Pictor®.

65, respectiv de la începutul alungirii tulpinii până la înflorirea etajelor superioare și inferioare ale paniculului.

La **culturile de cereale** se pot aplica maxim 2 tratamente, de la înfrățire și până la sfârșitul înfloritului (BBCH 25-69). Pentru completarea spectrului de combatere se poate amesteca în rezervor cu un produs omologat din grupa triazolilor.

Pentru **cultura de porumb** se aplică maxim 1 tratament pe perioada de vegetație BBCH 30-



Avantaje

- Combate bolile și crește în mod constant producția.
- Crește producția datorită efectelor AgCelence®.
- Reduce îmbătrânirea prematură a plantelor.
- Îmbunătățește calitatea producției.
- Crește productivitatea la recoltare.



Cultura

