



Soriale® LX

755 g/l fosfonat de potasiu



Date tehnice

Formulare: Concentrat solubil
Număr certificat omologare: 258PC/19.12.2016
Ambalaj: 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Soriale® LX este un fungicid sistemic pentru combaterea manei la vița de vie. Substanța activă este caracterizată de o mobilitate remarcabilă în plante, iar sistemicitatea sa se manifestă atât în mod ascendent, cât și în mod descendent. Acidul fosfonic - principiul activ, induce o reacție sistemică de autoapărare a plantei.

Activitatea produsului este mai evidentă în prezența vegetației tinere și în fenofaza de creștere activă, permițând, datorită sistemicității acestuia, și protejarea organelor vegetative care se formează după tratament.



Modul de folosire

Cultura	Spectrul de combatere	Doză
Vița de vie	Mana viței de vie (<i>Plasmopara viticola</i>)	3-4 l/ha



Aplicare / momentul aplicării

Produsul Soriale® LX se utilizează în tratamente preventive împotriva manei viței de vie (*Plasmopara viticola*), folosind o doză de 3 – 4 l/ha. Doza de 3 l/ha se aplică în situația unei presiuni reduse de infecție sau când se folosește în amestec cu fungicide de contact împotriva manei.

- Produsul nu este compatibil cu îngrășămintele foliare ce conțin azot (nitric și amoniacal).
- A nu se efectua amestecuri cu produse uleioase și a nu se pulveriza produsul pe culturi tratate anterior cu produse uleioase, deoarece ar împiedica pătrunderea produsului în plantă.

Se recomandă folosirea produsului Soriale® LX în amestec cu un fungicid de contact partener (ex. Soriale® LX + Polyram® DF).

Se fac maxim 5 tratamente pe sezon în intervalul: 6 frunze depliate (BBCH 16) până la compactarea ciorchinelui (BBCH 79).

- În caz de amestec cu alte produse se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate fizico-chimic preliminar.



Tehnica de aplicare

Tempul de pauză înaintea recoltării: 14 zile când se utilizează singur, dacă ultimul tratament cu Soriale® LX este în amestec cu alte produse, se aplică timpul de pauză indicat al componentelor.

Volumul de apă: minim 200 L și maxim 1000 L apă/ ha.



Avantaje

- Partenerul de încredere al viticultorilor pentru optimizarea tehnologiei de protecție împotriva manei la vița de vie.
- Acțiune sistemică deosebită, acropetală și bazipetală, stimulează mecanismele naturale de apărare a plantei.
- Timp de pauză scurt până la recoltare (doar 14 zile).
- Formulare lichidă pentru o acoperire uniformă a plantei.
- Bună solubilitate și compatibilitate.