



**Date tehnice**

**Substanță activă:** ..... 250 g/l fenpropimorf + 84 g/l epoxiconazol  
**Formulare:** ..... Suspoemulsie  
**Număr certificat omologare:** ..... 1847/29.09.1998  
**Ambalaj:** ..... 1 L, 5 L



**Caracteristici și mod de acțiune**

Tango® Super este un fungicid pe bază de fenpropimorf, din clasa morfolinelor și epoxiconazol din clasa azolilor, două substanțe active cu mecanisme diferite de acțiune. Tango® Super are acțiune sistemică și este transportat acropetal în plante.

O parte din epoxiconazol este dizolvat în fenpropimorf, ceea ce face ca absorbția să fie omogenă, asigurând o protecție îndelungată culturii.



**Modul de folosire**

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Grâu	<i>Erysiphe graminis</i>	Făinarea	0,75 l/ha
	<i>Puccinia recondita</i>	Rugină brună	0,75 l/ha
	<i>Septoria tritici</i>	Septorioză	0,75 l/ha
	<i>Fusarium spp.</i>	Fuzarioză	0,75 l/ha
	<i>Helminthosporium tritici repentis</i>	Pătarea cenușie a frunzelor	0,75 l/ha
Orz de toamnă	<i>Erysiphe graminis</i>	Făinarea	0,75 l/ha
	<i>Pyrenophora teres</i>	Pătarea brună a frunzelor	0,75 l/ha
	<i>Rhynchosporium secalis</i>	Arsura frunzelor	0,75 l/ha
Sfeclă	<i>Cercospora beticola</i>	Cercosporioza sfeclei	1 l/ha /
	<i>Erysiphe betae</i>	Făinarea sfeclei de zahăr	tratament



**Recomandări**

În funcție de momentul și intensitatea atacului, se pot aplica unul sau două tratamente. În condițiile în care se aplică un singur tratament, la grâu, momentul este de la începutul fazei de burduf până la începutul înspicării sau la apariția primelor simptome de făinare și/sau rugină, iar la orz de la începutul fazei de burduf sau la apariția primelor simptome de făinare.

În anii în care, prin condițiile climatice, sunt favorizate infecțiile timpurii și puternice, sunt necesare două tratamente la cereale: la grâu

primul tratament se poate efectua în intervalul de la sfârșitul înfrățirii până la apariția celui de al doilea internod, iar al doilea de la mijlocul fazei de burduf până la începutul înspicării; la orz se poate aplica primul tratament de la sfârșitul înfrățirii până la începutul apariției celui de al doilea internod, iar al doilea tratament de la apariția celui de al treilea internod până la înspicare.

Volumul de soluție (variază în funcție de echipamentul folosit) poate fi 200-300 l/ha.



**Avantaje**

- Efect excelent, spectru larg împotriva tuturor bolilor foliare, pentru cea mai bună protecție și recolte mai mari.
- Formulă îmbunătățită cu eficacitate ridicată.
- Independent de condițiile climatice - flexibilitate în aplicare și asigurarea recoltelor.
- Activitate îndelungată, mai ales împotriva *Septoria* (septorioză), ceea ce protejează câmpul pentru mai mult timp.



**Cultura**

