

Tehnologia BASF de protecție a culturii mărului

Problemă

Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale

Buruieni monocotiledonate anuale și perene

Rapăn (*Venturia inaequalis*)

Făinare (*Podosphaera leucotricha*)

Rapăn (*Venturia inaequalis*) și
Făinare (*Podosphaera leucotricha*)

Boli de depozitare (*Gloeosporium spp.* - putregaiul amar, *Penicillium spp.* - putrezirea umedă, *Botrytis spp.* - putregaiul cenușiu, *Alternaria* - putrezirea amară)

Regulator de creștere, Focul bacterian (*Erwinia amylovora*)

Soluție

Stomp® Aqua

Stratos® Ultra

Polyram® DF

Delan® Pro

Kumulus® DF

Kumulus® DF

Sercadis® *

Bellis®

Bellis®

Regalis® Plus



Urechișe de șoarece



Muguri florali vizibili



Buton roz



Înflorit




Scuturarea petalelor



Fruct 20 mm



Fruct 30-40 mm



Fruct 1/2 din mărime normală



Coacere

Notă privind **managementul rezistenței**: pentru evitarea apariției formelor de rezistență în combaterea rapănului, se recomandă utilizarea în amestec în rezervor a dozei minime omologate a produsului Sercadis® - 0,25 l/ha, împreună cu un fungicid care are și acțiune de contact - efect multi-site (ex. Delan® Pro, Polyram® DF)