



We create chemistry

NOVICURE®

Fungicid și bactericid care oferă performanță de top și în culturile ecologice.





Novicure®

Fungicid și bactericid cu efect de contact, omologat și pentru culturile ecologice, care are o capacitate de protecție ridicată pentru vița de vie, pomi fructiferi, cartof, legume și plante ornamentale.

Beneficii:

- Produs omologat și pentru culturile în sistem ecologic.
- Eficacitate ridicată împotriva fungilor și bacteriilor pentru majoritatea culturilor horticoale.
- Fereastră largă de aplicare.
- Nu creează rezistență față de formele care pot apărea în urma utilizării fungicidelor sistemice.
- Rezistență la spălare.
- Prin acțiunea sa preventivă, reușește să inhibe germinația sporilor și să blocheze dezvoltarea miceliului în plantă.
- Aderă bine pe plante și nu este nevoie de folosirea unui adeziv.
- Are o formulare modernă, care oferă o acoperire excelentă a frunzelor și fructelor.



Mod de folosire:

Novicure® se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA
Vița de vie	<i>Plasmopara viticola</i> – Mană <i>Elsinoe ampelina</i> – Antracnoză <i>Xylophilus ampelinus</i> – Necroză bacteriană	1,4-4,0 kg/ha
Pomi fructiferi (specii semințoase)	<i>Venturia inaequalis</i> – Rapăn <i>Nectria galligena</i> – Cancerul deschis al pomilor <i>Pseudomonas sp.</i> – Arsură bacteriană	3,5-6,0 kg/ha (tratament de la căderea frunzelor până la apariția mugurilor) 0,75-1,25 kg/ha (tratament în vegetație)
Pomi fructiferi (specii sămburoase)	<i>Coryneum sp.</i> – Gomoză (ciuruirea frunzelor) <i>Taphrina deformans</i> – Bâsicarea frunzelor <i>Pseudomonas sp.</i> – Arsură bacteriană <i>Xanthomonas campestris</i> – Putregai	6,0 kg/ha (tratament la căderea frunzelor și la sfârșitul iernii) 1,25-1,5 kg/ha (tratament la apariția mugurilor – faza de buton roz)
Nuc, alun	<i>Xanthomonas arboricola</i> - Arsură bacteriană <i>Cytospora sp.</i> – Citosporioză	1,6 – 2,4 kg/ha (tratamente înainte și după înflorire)
Tomate	<i>Phytophthora infestans</i> – Mană <i>Alternaria solani</i> – Alternarioză <i>Colletotrichum sp.</i> – Putregaiul rădăcinilor <i>Xanthomonas vesicatoria</i> - Pătarea veziculară <i>Pseudomonas syringae</i> - Pătarea bacteriană	1,6-2,4 kg/ha
Cartof	<i>Phytophthora infestans</i> – Mană <i>Alternaria solani</i> – Alternarioză <i>Colletotrichum sp.</i> – Putregaiul rădăcinilor	1,6-2,4 kg/ha
Cucurbitacee (pepene galben, pepene verde, dovleac, dovlecel, castravete)	<i>Peronospora cubensis</i> – Mană <i>Pseudomonas syringae</i> – Pătarea unghiulară <i>Alternaria solani</i> – Alternarioză <i>Colletotrichum sp.</i> – Putregaiul rădăcinilor și fructelor	1,4-1,8 kg/ha
Anghinare	<i>Bremia sp.</i> – Mană <i>Pseudomonas sp.</i> – Pătarea unghiulară <i>Xanthomonas cynerae</i> – Pătarea bacteriană	1,4-1,8 kg/ha
Crucifere (conopidă, broccoli, varză cretă, varză albă, varză roșie, varză de căpățână, varză chinezească, varză de Bruxelles, gulii, varză neagră)	<i>Peronospora sp.</i> – Mană <i>Pseudomonas syringae</i> – Pătarea unghiulară <i>Xanthomonas campestris</i> – Pătarea bacteriană	1,4-1,8 kg/ha
Usturoi, ceapă, praz, hașmă	<i>Peronospora destructor</i> – Mană <i>Pseudomonas syringae</i> – Pătarea pustulară	1,4-1,8 kg/ha

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA
Vinete	<i>Phytophthora infestans</i> – Mană <i>Alternaria solani</i> – Alternarioză <i>Colletotrichum sp.</i> – Antracnoză <i>Xanthomonas vesicatoria</i> – Pătare bacteriană <i>Pseudomonas syringae</i> – Pătarea pustulară	1,4-1,8 kg/ha
Salată (cicoare, andive, salată, ridiche, rucola, nap suedez, andive tip salată, fetică)	<i>Bremia lactucae</i> – Mană <i>Pseudomonas sp.</i> – Bacterioză <i>Xanthomonas cynerae</i> – Putregai <i>Pseudomonas cichorii</i> – Pătarea unghiulară <i>Xanthomonas axonopodis</i> – Pătare bacteriană	1,4-1,8 kg/ha
Alte legume cu frunze (busuioc, sfeclă elvețiană, cardon, arpagic, fenicul, pătrunjel, țelină, spanac)	<i>Pseudomonas sp.</i> – Pătare unghiulară <i>Xanthomonas sp.</i> – Pătare bacteriană <i>Bremia sp.</i> – Mană	1,4-1,8 kg/ha
Rădăcinoase	<i>Alternaria dauci</i> – Alternarioză <i>Peronospora crustosa</i> – Mană <i>Cercospora beticola</i> – Cercosporioză	1,4-1,8 kg/ha
Leguminoase	<i>Xanthomonas axonopodis</i> – Pătarea bacteriană <i>Pseudomonas syringae</i> – Pătarea pustulară	1,4-1,8 kg/ha
Căpșuni	<i>Mycosphaerella fragariae</i> – Pătarea roșie <i>Xanthomonas fragariae</i> – Arsură bacteriană	1,5-2,0 kg/ha
Culturi floricole și ornamentale	<i>Peronospora sp.</i> – Mană <i>Venturia sp.</i> – Rapăn <i>Cytospora sp.</i> – Citosporioză <i>Coniothyrium sp.</i> – Micoză <i>Taphrina deformans</i> – Bășicarea frunzelor	2,5-4,0 kg/ha



Date tehnice:

Substanțe active:

400 g/kg Cupru (sub formă de sulfat de cupru tribazic). Formulare: granule dispersabile în apă (WG)

Caracteristici și mod de acțiune:

Novicure®

- Datorită formulării ca sulfat de cupru tribazic, determină o rezistență la spălare, miscibilitate și stabilitate mărită, acțiune fungică și bacterică deosebită.
- Formularea cuprului sub formă de sulfat de cupru tribazic, permite eliberarea a 25% din ioni într-un mod progresiv, iar 75% sunt eliberați imediat. Astfel, se elimină posibilitatea apariției fenomenului de fitotoxicitate, îndeosebi în primăverile ploioase și reci.
- Fiind un produs de contact, oferă o capacitate foarte bună prin care substanța aderă la nivelul plantei.



Recomandări:

- Se recomandă în special la primele și ultimele tratamente, astfel, primăvara diminuează pericolul cauzat de înghețurile târzii și prelungește perioada de repaus vegetativ, iar toamna ajută la maturarea lemnului și contribuie la o mai rapidă intrare în perioada de repaus.
- Atât la cultura viței de vie, cât și la alte culturi horticole, precum legume, cartof, pomi fructiferi sau plante ornamentale, cuprul este folosit în principal pentru combaterea manei (*Plasmopara viticola*). Astfel, de-a lungul utilizării cuprului în cadrul tehnologiilor de protecție, se recomandă ca fiind un bun instrument în managementul bolilor.
- În cazul amestecării cu orice alt produs, trebuie respectat cel mai lung timp de pauză.
- Pentru evitarea formelor de rezistență, se vor alterna tratamentele cu produse conținând alte substanțe active.
- Recomandăm utilizarea următoarelor volume de soluție:
 - Vița de vie: 2-10 hl/ha;
 - Pomi fructiferi: 8-15 hl/ha;
 - Alte specii horticole, florale și ornamentale: 6-8 hl/ha.
- **Nu se recomandă:**
 - Aplicarea în perioada înfloritului;
 - Tratarea speciilor sensibile la cupru.

Timp de pauză:

- Viță de vie - 21 zile
- Pomi fructiferi (sâmburoase și semințoase) - 21 zile
- Căpșuni, tomate, cucurbitacee (cu coaja comestibilă) - 3 zile
- Legume proaspete - 3 zile
- Cartof, salată, cucurbitacee (cu coajă necomestibilă: pepene, dovlecel, dovleac) - 7 zile
- Nuc, alun, legume cu rădăcină, alte legume cu frunze (crucifere) - 14 zile



BASF SRL

Floreasca Park, Șos. Pipera nr. 43,
Corp A, Etaj 1, Sector 2, 014254 - București
T: 021 529 90 68/ 61 | F: 021 529 90 69
www.agro.basf.ro

Director Vânzări Culturi Horticole

Robert-Ionuț Băicoianu, Tel: 0745 101 182
E-mail: robert-ionut.baicoianu@basf.com

Reprezentanți vânzări culturi horticole:

Est: Carmen Stoica, tel. 0730 202 797
e-mail: carmen.stoica@basf.com

Vest și Centru: Mihail Manolache, tel. 0737 717 968
e-mail: mihail.manolache@basf.com

Sud-Est: Marius Andone, tel. 0730 127 003
e-mail: marius.andone@partners.basf.com

Sud-Vest: Victor Holban, tel. 0737 970 001
e-mail: victor.holban@basf.com

Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de folosirea informațiilor din această broșură.