



Problemă	Soluție
<p>Mana castraveților - <i>Pseudoperonospora cubensis</i></p>	<p>Polyram® DF 1,6 kg/ha</p>
<p>Făinarea - <i>Sphaerotheca fuliginea</i></p>	<p>Kumulus® DF 3,2 kg/ha</p>
<p>Mană - <i>Peronospora cubensis</i> Pătarea unghiulară - <i>Pseudomonas syringae</i> Alternarioză - <i>Alternaria solani</i> Putregaiul rădăcinilor și fructelor - <i>Colletotrichum sp</i></p>	<p>Novicure® 1,4-1,8 kg/ha</p>
<p>Făinarea - <i>Sphaerotheca fuliginea</i>, <i>Erysiphe cichoracearum</i> Pătarea brună - <i>Mycosphaerella melonis sin. Didymella bryoniae</i></p>	<p>Dagonis® 0,6 l/ha</p>
<p>Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i></p>	<p>Scala® 2 l/ha</p>
	<p>Dezvoltarea primelor frunze</p> <p>Deschiderea primelor flori</p> <p>Creșterea fructelor</p> <p>Coacerea deplină a fructelor</p>

Timp de pauză până la recoltat:

Polyram® DF - 3 zile | Kumulus® DF - 3 zile | Dagonis® - 3 zile | Scala® - 3 zile | Novicure® - 3 zile