



## Problemă

Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate

Buruieni dicotiledonate

Antracnoza - *Mycosphaerella pinodes*, *Ascochyta pisi*,  
Putregaiul alb - *Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia minor*,  
*Sclerotinia trifolium*  
Rugina - *Uromyces pisi*

**Corum®**: la apariția primelor frunze trifoliolate până la apariția primilor lăstari laterali. Se va aplica împreună cu adjuvantul Dash® HC în doză de 0,25 – 0,3 litri la 100 litri de soluție. Buruienile trebuie să se aple, de asemenea, în primele stadii de dezvoltare (2-4 frunze).  
**Basagran® SL**: Se aplică în postemergența culturilor; buruieni în faza de 2-4 frunze. (BBCH 12-14)

## Soluție

**Corum®**  
1,25 l/ha + adjuvant  
(Dash® HC)

**Basagran® SL**  
2 l/ha

**Dagonis®**  
2 l/ha

Prima frunză  
adevărată

3 frunze  
adevărate

6 frunze  
adevărate

Muguri florali  
vizibili

Începutul  
înfloritului

Dezvoltarea  
păstăilor

**Temp de pauză  
până la recoltat:**

**Dagonis® - 7 zile | Corum® - 35 zile**