



| Problemă | Soluție |
|---|--|
| <p>Făinarea - <i>Erysiphe heraclei</i> Alternarioza - <i>Alternaria dauci</i> Putregaiul negru al morcovului - <i>Alternaria radicina</i> Putregaiul alb - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i></p> | <p>Dagonis® 0,6 l/ha (făinare); 1 l/ha (alternarioză); 2 l/ha (putregaiul alb)</p> |
| <p>Alternarioza - <i>Alternaria dauci</i> Putregaiul alb - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i></p> | <p>Scala® 2 l/ha</p> |
| <p>Alternarioză - <i>Alternaria dauci</i> Mană - <i>Peronospora crustosa</i> Cercosporioză - <i>Cercospora beticola</i></p> | <p>Signum® 0,75 kg/ha</p> <p>AgCelence® Dincolo de așteptări.</p> |
| | <p>Novicure® 1,4-1,8 kg/ha</p> |
| <p>Dozele la Dagonis® sunt diferențiate în funcție de agentul patogen.</p> | |
| | <p>Dezvoltarea primelor funze</p> <p>Formarea rădăcinilor</p> <p>Rădăcinile au 30% din forma finală</p> <p>Rădăcinile au 70% din forma finală</p> <p>Rădăcinile au ajuns la forma finală</p> |

