



Problemă	Soluție
Buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate	Stomp® Aqua 2 - 3 l/ha
Făinarea - <i>Leveillula taurica</i> Alternarioza - <i>Alternaria solani</i>	Dagonis® 0,6 l/ha (făinare); 1 l/ha (alternarioză)
Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i> Făinarea - <i>Leveillula taurica</i>	Scala® 2 l/ha
Putregaiul cenușiu - <i>Botrytis cinerea</i>	Novicure® 1,4-1,8 kg/ha
Mană - <i>Phytophthora infestans</i> Alternarioză - <i>Alternaria solani</i> Antracnoză - <i>Colletotrichum sp.</i> Pătare bacteriană - <i>Xanthomonas vesicatoria</i> Pătarea pustulară - <i>Pseudomonas syringae</i>	Alverde® 0,25 l/ha
Gândacul din Colorado - <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	

Dezvoltarea frunzelor și lăstarilor laterali
Înflorit
Dezvoltarea fructelor
Coacerea fructelor

Stomp® Aqua se aplică înaintea transplantării

Timp de pauză până la recoltat:

Dagonis® - 3 zile | Scala® - 3 zile | Signum® - 3 zile | Alverde® - 3 zile | Novicure® - 3 zile