

Utilizați erbicidul Clearfield® pentru rapiță doar la hibrizii de rapiță Clearfield®.

Conformitate



• **Bunele practici agricole:** Urmați întotdeauna bunele practici agricole locale. Atunci când este posibil, utilizați metodele integrate de management al buruienilor, cum ar fi combaterea buruienilor răsărite înainte de semănarea culturii de rapiță Clearfield®.

• **Legislația în vigoare:** Respectați întotdeauna legislația în vigoare și urmați instrucțiunile de folosire a erbicidelor înscrise pe etichetă, pentru a obține cel mai bun control posibil al buruienilor.

Evitarea afectării culturii



1) Evitarea aplicării incorecte. Rețineți că ambalajele semințelor Clearfield® și erbicidele Clearfield® au întotdeauna inscripționată marca Clearfield®. De asemenea, numele hibrizilor pentru rapiță Clearfield® au întotdeauna sufixul "CL".

2) Utilizarea erbicidelor din Grupa 2 HRAC* (menționate mai jos). Pentru a evita afectarea culturilor, nu se va aplica asupra hibrizilor pentru rapiță Clearfield® niciun erbicid care face parte din Grupa 2 HRAC* și care nu este un erbicid pentru rapiță Clearfield®.

Managementul samulastrei de rapiță Clearfield®



1) Buna igienă a câmpului.

După cultivarea rapiței Clearfield®, samulastra de rapiță Clearfield® poate apărea în câmpul respectiv și, eventual, pe parcele vecine, ca urmare a unor practici agricole normale și, probabil, în urma polenizării între cultura de rapiță și culturi vecine.

Aplicați întotdeauna o bună igienă în câmp și, în special:

- combateți buruienile în cultura de rapiță
- evitați mutarea mecanică a semințelor de la un câmp la altul cu echipamente de semănat sau de recoltat
- stimulați germinația samulastrei de rapiță după recoltare deoarece samulastra poate fi controlată cu erbicide sau prin lucrări mecanice.

2) Controlul samulastrei de rapiță în culturile următoare.

Pentru a controla samulastra de rapiță Clearfield®, fie folosiți (a) un erbicid corespunzător ce nu face parte din Grupa 2, fie (b) o combinație între erbicide corespunzătoare ce nu fac parte din Grupa 2 cu erbicide din Grupa 2. Folosirea de erbicide cu mai multe moduri de acțiune este o practică dovedită, utilizată pentru a reduce șansa dezvoltării buruienilor rezistente la erbicide.

Vă rugăm contactați distribuitorul dumneavoastră local sau un reprezentant BASF pentru a stabili care sunt cele mai bune opțiuni privind erbicidele disponibile pentru controlul samulastrei de rapiță Clearfield®.

Condiții de utilizare

Sistemul de producție Clearfield® pentru rapiță va fi folosit cu condiția respectării prevederilor privind bunele practici de utilizare și a instrucțiunilor de folosire.

Responsabilitate



Compania BASF SRL sau companiile sale afiliate nu pot fi făcute responsabile în niciun fel față de utilizatori pentru orice pierderi sau daune rezultate din, legate de, sau în legătură cu, (a) utilizarea de erbicide din Grupa 2 HRAC, care nu sunt erbicide Clearfield®, aplicate hibrizilor de rapiță Clearfield® sau (b) non-conformitatea cu oricare dintre celelalte instrucțiuni menționate mai sus.

În astfel de situații, compania BASF nu își asumă niciun fel de responsabilitate, aceasta fiind preluată de către utilizator.

*Erbicide din Grupa 2 HRAC, inhibitori de ALS, sunt produse din următoarele familii chimice: imidazolinone, pirimidine, sulfonamide, sulfoniluree, triazolopirimidine. Pentru mai multe informații privind grupurile de erbicide, vizitați: <http://www.hracglobal.com>

**Pentru informații suplimentare, inclusiv pentru recomandări specifice privind erbicidele destinate combaterii samulastrei de rapiță Clearfield® vizitați www.clearfield.basf.eu și www.agro.basf.ro