

**Date tehnice** Pachetul fungicid Flexity® Trio conține următoarele produse:

Flexity® - 300 g/l metrafenonă

Mizona® - 30 g/l Xemium® (fluxapiroxad) + 200 g/l piraclostrobin

**Caracteristici și mod de acțiune**

Pachetul fungicid Flexity® Trio este soluția completă pentru primul tratament, care conține trei substanțe active din grupe chimice diferite, pentru combaterea întregului spectru de boli care apar primăvara devreme. Cele trei substanțe active au moduri de acțiune diferite, astfel combaterea agenților patogeni este sigură. Metrafenona, din grupa chimică a benzofenonelor, este cea mai bună substanță activă în combaterea făinării, piraclostrobin, din grupa chimică a

strobilurinelor, este cea mai eficientă strobilurină de pe piața din România, iar Xemium® este cea mai nouă inovație de la BASF, din grupa chimică SDHI, cu eficacitate de excepție împotriva septoriozei. Caracteristicile și sinergismul dintre cele trei substanțe active, poziționează Flexity® Trio ca prim tratament în primăvară, oferind flexibilitate în aplicare în funcție de stadiul de dezvoltare a culturii și condițiilor climatice de la momentul aplicării.

**Modul de folosire**

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Grâu de toamnă Grâu de primăvară Grâu durum Grâu spelta	<i>Erysiphe graminis</i>	Făinarea	Flexity® 0,25 L/ha + Mizona® 0,5 L/ha
	<i>Puccinia triticina</i>	Rugina brună	
	<i>Zymoseptoria tritici</i>	Septorioza	
Orz de toamnă, Orz de primăvară	<i>Pyrenophora teres</i>	Pătarea reticulară a frunzelor de orz	
	<i>Rhynchosporium secalis</i>	Arsura frunzelor de orz (rincosporioza)	
	<i>Blumeria graminis</i>	Făinarea	

**Recomandări**

Un pachet pentru 20 de hectare: 5 litri Flexity® + 10 litri Mizona®

**Tehnica de aplicare**

Perioada de aplicare: se aplică în fenofazele BBCH 30 – 61, respectiv de la începutul alungirii tulpinii și până la începutul înfloritului.

Timp de pauză: 35 zile.

Volumul de apă recomandat: între 100 – 400 litri/hectar.

**Avantaje**

- Soluție completă cu 3 substanțe active dedicate principalelor boli care apar primăvara devreme: făinare, septorioză, rugini.
- Substanțe active cu 3 moduri diferite de acțiune pentru a împiedica apariția agenților patogeni cu forme de rezistență.
- Siguranța eficacității până la al doilea tratament.
- Flexibilitate în aplicare, ce permite o mai bună organizare a activităților din fermă.

**Cultura**