



Date tehnice

Substanță activă: 70,8 g/kg piroxsulam + 14,2 g/kg florasulam + 70,8 g/kg cloquintocet – mexil (safener)
Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)
Număr certificat omologare: 2868 din 11.07.2013
Ambalaj: Pachet de 0,795 kg Floramix™ + 1,8 L adjuvant Dassoil 26-2N (suficient pentru acoperirea a 3 hectare)



Caracteristici și mod de acțiune

Floramix™ conține două substanțe active: piroxsulam și florasulam, ambele molecule fiind de tip ALS (inhibitori de acetolactat sintază), cu translocare sistemică în plantă. Erbicidul Floramix™ se aplică în combinație cu adjuvantul Dassoil 26-2N, pentru a se îmbunătăți eficacitatea în cazul buruienilor moderat sensibile.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Grâu	Buruieni monocotiledonate anuale: <i>Apera spica-venti</i>	*120 g/ha + 0,6 L/ha adjuvant
	Buruieni monocotiledonate anuale: <i>Avena fatua</i> , <i>Bromus spp.</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i>	*260 g/ha + 0,6 L/ha adjuvant
	Monocotiledonate: înainte de înfrățire	
	Dicotiledonate anuale: 2 – 4 frunze	

*Doza de aplicare de 120 g/ha + 0,6 l/ha adjuvant se recomandă pentru combaterea *Apera spica-venti*.
 *Doza de aplicare de 260 g/ha + 0,6 l/ha adjuvant se recomandă pentru restul buruienilor menționate pe etichetă.



Recomandări

Floramix™ poate fi utilizat postemergent, de la stadiul de 2-3 frunze și până la stadiul de 2 noduri al plantei de cultură (aplicare doar în primăvară). Pentru a obține cele mai bune rezultate, se recomandă să se erbicideze atunci când buruienile sunt în creștere activă. Combaterea este influențată de stadiul de dezvoltare al buruienilor, stadiile tinere de dezvoltare fiind mai ușor controlate.

Controlul optim al buruienilor monocotiledonate se realizează în fenofaza de până la 3 frați pentru *Apera spica-venti* și până la înfrățire pentru *Avena fatua*, iar pentru buruienile dicotiledonate anuale la 2-4 frunze.

Temperatura optimă de aplicare este între 8 - 25°C, dar tratamentele pot fi făcute începând de la 5°C. În acest caz, apariția simptomelor de combatere este mai lentă, dar controlul final nu este afectat.



Avantaje

- Spectru larg de combatere a buruienilor (monocotiledonate și dicotiledonate), inclusiv a buruienilor graminee problemă precum *Apera spica-venti*, *Avena fatua*, *Bromus spp.*, *Alopecurus myosuroides*, *Lolium spp.*
- Combatere eficientă a buruienilor, chiar și la temperaturi scăzute.
- Selectivitate foarte bună pentru cultura de grâu.
- Siguranță în rotația culturilor.



Cultura



*Floramix™ - mărci înregistrate ale Corteva Agriscience și ale companiilor afiliate

Eficacitatea erbicidului Floramix™ poate fi redusă în condițiile unui sol foarte uscat sau a unor temperaturi foarte scăzute, condiții în care dezvoltarea buruienilor este încetinită.

Floramix™ nu trebuie aplicat în amestec cu alt produs pe bază de inhibitor ALS. Nu se recomandă amestecul în rezervor cu erbicide pe bază de ester al acidului 2,4 D. Pot apărea efecte fitotoxice dacă se aplică în amestec cu regulatori de creștere. Ar trebui așteptat minimum 7 zile între tratamente. Pentru a evita efecte de fitotoxicitate, nu aplicați în amestec cu un insecticid organofosforic. Intervalul dintre tratamente ar trebui să fie de minimum 14 zile.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE

MONOCOTILEDONATE SENSIBILE	Mărgelușă (<i>Lithospermum arvense</i>) Mușetel (<i>Matricaria spp.</i>) Lucernă (<i>Medicago spp.</i>) Mac de câmp (<i>Papaver rhoeas</i>) Ridiche sălbatică (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Muștar (<i>Sinapis arvensis</i>) Rocoină (<i>Stellaria media</i>) Frunza voinicului (<i>Sisymbrium spp.</i>) Punguliță (<i>Thlaspi arvense</i>)
MONOCOTILEDONATE MODERAT SENSIBILE	DICOTILEDONATE MODERAT SENSIBILE
larbă vântului (<i>Apera spica-venti</i>) Odos (<i>Avena fatua</i>) Coadă vulpii (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Păiușă (<i>Bromus spp.</i>) Iarbă bărbosă (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Raigras (<i>Lolium spp.</i>) Pir târător (<i>Agropyron repens</i>) Mohor verde (<i>Setaria viridis</i>) Iarbă cocoșului (<i>Adonis spp.</i>) Știr (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Romaniță (<i>Anthemis arvensis</i>) Rapiță sălbatică (<i>Brassica spp.</i>) Traista ciobanului (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Voinică (<i>Descurainia spp.</i>) Turiță (<i>Galium aparine</i>) Mușcată (<i>Geranium spp.</i>) Sugel (<i>Lamium amplexicaule</i>)	Hrișcă urcătoare (<i>Polygonum convolvulus</i>) Albăstriță comună (<i>Centaurea cyanus</i>) Lobodă porcească (<i>Chenopodium album</i>) Pălămidă (<i>Cirsium arvense</i>) Nemțîșor de câmp (<i>Consolida orientalis</i>) Troscot (<i>Polygonum aviculare</i>) Veronica (<i>Veronica hederifolia</i>) Veronica (<i>Veronica persica</i>) Mazăre de primăvară (<i>Vicia sativa</i>) Viorele de ogoare (<i>Viola arvensis</i>)