



Date tehnice

Substanță activă: 66,6 g/L Revysol® (mefentrifluconazol) + 100 g/L metrafenonă + 80 g/L piraclostrobin
Formulare: Concentrat emulsionabil (EC)
Număr certificat omologare: 956PC/ 25.04.2024
Ambalaj: 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Fungicidul Revyflex® conține 3 substanțe active - Revysol® (mefentrifluconazol), metrafenonă și piraclostrobin:

- Noul triazol Revysol® aparține grupului de inhibitori ai biosintezei sterolului, fiind primul izopropanol-azol descoperit și având o eficacitate unică împotriva unui număr mare de boli care nu sunt ușor de controlat de către triazolii convenționali. De asemenea, Revysol® controlează și agenții patogeni care au fost deja instalați în țesutul plantelor (acțiune curativă).
 - Cea de-a doua substanță activă este metrafenona, din grupa chimică a benzofenonelor, care oferă o combatere excelentă a făinării, deoarece controlează agentul patogen în toate etapele de dezvoltare ale acestuia.
- Piraclostrobinul este o strobilurină cu acțiune translaminară și sistemie locală, ce inhibă germinația sporilor și controlează creșterea miceliului și sporularea.
- Combinția celor 3 substanțe active formează un fungicid complex care oferă eficacitate excelentă împotriva unui spectru larg de boli și, de asemenea, oferă efecte fiziologice AgCelence® dovedite, care conduc la îmbunătățirea fotosintezei, dar și la utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor pe bază de azot și a apei din sol.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare		Doză
	Denumirea științifică	Denumirea populară	
Grâu de toamnă *Grâu durum *Grâu spelta	<i>Blumeria graminis</i>	Făinarea	0,5 – 1 L/ha
	<i>Zymoseptoria tritici</i>	Septorioza	
	<i>Puccinia triticina</i>	Rugina brună	
	<i>Puccinia striiformis</i>	Rugina galbenă	
	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	Pătarea reticulară a frunzelor de grâu	
Orz de toamnă	<i>Oculimacula spp.</i>	Pătarea în ochi a bazei tulpinii	0,5 – 1 L/ha
	<i>Blumeria graminis</i>	Făinarea	
	<i>Pyrenophora teres</i>	Pătarea reticulară a frunzelor de orz	
	<i>Puccinia hordei</i>	Rugina orzului	



Recomandări

Se aplică maximum 2 tratamente pe sezon, la un interval de minimum 14 zile între aplicări, pe perioada de vegetație BBCH 30 – 59, respectiv de la începutul alungirii tulpinii și până la sfârșitul înspicatului (apariția completă a inflorescenței).

Pentru combaterea agentului patogen *Oculimacula spp.*, fungicidul Revyflex® se aplică maximum 1 tratament pe sezon, în perioada de vegetație BBCH 30 – 32, respectiv de la începutul alungirii tulpinii și până la stadiul de 2 internoduri vizibile.

Revyflex® este un fungicid dedicat aplicării ca prim tratament (T1), deoarece combate excelent bolile care apar primăvara devreme. Pentru condițiile climatice și presiunea de boli din România, BASF recomandă aplicarea dozei medii de 0,75 L/ha, care se va dovedi a fi suficientă pentru controlul bolilor.



Tehnica de aplicare

Timp de pauză: 56 zile



Avantaje

- Fungicid ready-mix, cu 3 substanțe active și cu moduri de acțiune diferite.
- Spectru larg de combatere al bolilor.
- Acțiune rapidă și de lungă durată.
- Rezistență la ploaie și protecție împotriva razelor UV.
- Performanțe stabile și selectivitate excelentă, chiar și la temperaturi scăzute.



Cultura

