



## Erbicide | Effigo™ S



### Date tehnice

**Substanță activă:** ..... Clopiralid - 240g/l + Picloram - 80 g/l + Aminopirialid – 40g/l  
**Formulare:** ..... Lichid solubil (SL)  
**Număr certificat omologare:** ..... 2862 din 18.04.2011  
**Ambalaj:** ..... 1 L



### Caracteristici și mod de acțiune

Effigo™ S este un erbicid cu aplicare foliară, care combate buruienile dicotile anuale și perene din cultura de rapiță. Effigo™ S are o dublă acțiune: de contact, datorată substanței active picloram, și sistemică, datorată substanțelor active clopiralid și aminopirialid. Cele trei substanțe active din Effigo™ S au un mod asemănător de distribuire și acțiune. Substanțele sunt absorbite atât la nivel foliar, cât și la nivel radicular, sunt translocate atât acropetal, cât și bazipetal, și se acumulează în țesuturile meristematice ale plantelor. Au un mod de acțiune “auxinic”.

Buruieni sensibile: *Cirsium arvense*, *Centaurea cyanus*, *Viola arvensis*, *Chenopodium album* (stadiul de dezvoltare 2-4 frunze), *Papaver rhoeas*, *Matricaria inodora*, *Galium aparine*, *Anthemis arvensis*, *Amaranthus spp.*, *Sonchus arvensis*, *Ambrosia artemisiifolia*, *Geranium dissectum*, samulastră de floarea-soarelui, *Polygonum spp.*, *Solanum nigrum*.

Buruieni moderat sensibile: *Stellaria media*, *Lamium sp.*, *Veronica sp.*



### Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Rapiță	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,2 l/ha toamna sau 0,25 l/ha primăvara



### Recomandări

Effigo™ S se poate aplica preemergent sau postemergent timpuriu (stadiu de 1-3 frunze) sau se poate aplica postemergent în toamnă, la stadiul rapiței de la 3 până la 9 frunze, sau primăvara, înainte ca mugurii florali să fie vizibili.

A nu se utiliza produsul cu 2 zile înainte sau după nopți cu condiții de îngheț sau când apar fluctuații mari de temperatură între zi și noapte.

Pentru aplicarea în toamnă, Effigo™ S se poate combina cu alte pesticide. Nu recomandăm amestecul Effigo™ S cu alte produse în primăvară. Volumul de apă recomandat pentru prepararea soluției de stropit: 100-400 L/ha.



### Avantaje

- Spectru larg de combatere a buruienilor dicotile în postemergență.
- Flexibilitate în aplicare, în toamnă sau primăvară.
- Selectivitate foarte bună pentru cultura de rapiță.



### Cultura



\*Effigo™ S - ™ mărci comerciale ale Corteva Agriscience și ale companiilor afiliate.