



Erbicide | Pontos®



Date tehnice

Substanță activă: 100 g/l picolinafen + 240 g/l flufenacet
Formulare: suspensie concentrată
Număr certificat omologare: 800PC/ 23.08.2022
Ambalaj: 5 L



Caracteristici și mod de acțiune

Pontos® este un erbicid destinat culturilor de grâu și orz, cu aplicare toamna în preemergență sau postemergență timpurie. Datorită celor 2 substanțe active din compoziție, picolinafen și flufenacet, erbicidul Pontos® oferă un spectru larg de combatere, cu eficacitate excelentă împotriva buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate, cum ar fi: iarba vântului, firuța, coada vulpii, turița, ventrilica, rocina, mușețelul, macul, samulastra de rapiță convențională și Clearfield®, etc.

Cele două substanțe active sunt preluate prin rădăcinile și coleoptilele plantelor, fiind ulterior transportate prin xilem.

Cu o rezidualitate foarte bună, Pontos® păstrează cultura curată de buruieni o perioadă lungă de timp, oferind posibilitatea plantelor de cultură să se dezvolte și să își atingă potențialul maxim de producție.



Modul de folosire

Cultura	Agentul de dăunare	Doză
Grâu de toamnă	Buruieni monocotiledonate (<i>Apera spica-venti</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Lolium multiflorum</i>) și dicotiledonate (<i>Galium aparine</i> , <i>Matricaria spp.</i> , <i>Veronica spp.</i> , <i>Viola arvensis</i> , <i>Chenopodium album</i> , etc.)	0,5 – 1 l/ha Se aplică preemergent în toamnă, de la semănat până la răsărire. Maxim 250 g/ha flufenacet- chiar și în combinație cu alte produse de protecție a plantelor care conțin această s.a. - pe aceeași suprafață în decurs de 2 ani.
Orz de toamnă		0,5 l/ha Se aplică postemergent în toamnă, de la apariția primei frunze și până la sfârșitul înfrățirii. Maxim 250g/ha flufenacet- chiar și în combinație cu alte produse de protecție a plantelor care conțin această s.a. - pe aceeași suprafață în decurs de 2 ani.



Recomandări

Pontos® se aplică toamna la culturile de grâu și orz. În preemergență, de la semănat și până la răsărit (BBCH 00 – 09), se folosește doza de 0.5 – 1 l/ha, iar în postemergență timpurie, de la apariția primei frunze și până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 10 – 29), se aplică doza de 0.5 l/ha.

La aplicarea în postemergență timpurie, buruienile trebuie să fie nerăsărite sau în stadii timpurii de dezvoltare (cotiledoane sau maxim 1-2 frunze).



Avantaje

- Combatere eficientă a unui spectru larg de buruieni.
- Efect rezidual de lungă durată.
- Flexibilitate în aplicare.



Cultura

