

NOVICURE®

FUNGICID

FUNGICID PE BAZĂ DE CUPRU SUB FORMĂ DE GRANULE DISPERSABILE ÎN APĂ

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 455PC/15.11.2018
Autorizat pentru folosirea în agricultura ecologică cu respectarea EC834/2007
Conține: Cupru metallic 40% (sub formă de sulfat de cupru tribazic)
Cod UFI: 13S1-19MC-Y5S8-QDAR
Formulare: granule dispersabile în apă (WG)

TITULAR AL AUTORIZĂRII: UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
Claudius Prinsenlaan 144 A 4818 CP, BREDA, NOORD-BRABANT - The Netherlands
T 0031 (0) 85 0712300

PRODUCĂTOR: CEREXAGRI S.A., Mouxenx, Franța

IMPORTATOR: UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL
Str. Izvor 92-96, clădirea Forum III, et. 4, sector 5, București, tel.: +40 21 529 55 44

DISTRIBUITOR:

BASF

We create chemistry

BASF SRL ROMÂNIA

Floreasca Park, Șoseaua Pipera, nr. 43, Clădirea A, Etaj 1, Sector 2, București,
Cod Poștal: 014254, Departamentul Agro
Telefon: (004) 021 5299060, 5299061, 5299000
Fax: (004) 021 5299069, 5299099

CERINȚE SUPLIMENTARE: Nu pătrundeți în zona tratată înainte ca vegetația să fie complet uscată. Nu contaminați apa cu produsul sau recipientul acestuia. Nu curățați echipamentul de aplicare în vecinătatea apelor de suprafață. Evitați contaminarea prin intermediul sistemelor de drenare a apelor de la fermele agricole și de pe drumuri.

INFORMAȚII PENTRU PERSONALUL MEDICAL:

Simptome: denaturarea proteinelor cu leziuni ale mucoaselor, leziuni hepatice

și renale și leziuni ale SNC, hemoliză. Vărsături de culoare verde, arsuri gastroesofagiene, diaree cu sânge, colici abdominale, icter hemolitic, insuficiență hepatică și insuficiență renală, convulsii, colaps. Febră de la inhalarea de metal. Iritant pentru piele și ochi.

Tratament: lavaj gastric cu soluție lacto-albminoasă în caz de cupremie ridicată, utilizați chelatori, penicilamină dacă calea orală este accesibilă pentru utilizare sau Ca EDTA intravenos și BAL intramuscular, în rest tratament simptomatic.

FRAZE DE PERICOL:

H302 - Nociv în caz de înghițire. **H411** - Toxic pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, respectați instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P264 - Spălați-vă bine mâinile după utilizare.

P270 - Nu mâncați, beți sau fumați în timpul utilizării produsului. **P273** - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru față/ochi.

P301+P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P391 - Colectați scurgerile de produs. **P501** - Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

FRAZE STANDARD DE PRUDENȚĂ SPECIALE (CONFORM REGULAMENTULUI NR. 547/2011):

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață / a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)! **SPe3** - Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15 m până la apele de suprafață!

ATENȚIE



Avertizare: consultați un Centru de Informare Toxicologică.

Centru toxicologic: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 București.

CARACTERISTICI: NOVICURE este un fungicid cupric fabricat printr-un proces industrial patentat, care asigură prezența sulfatului de cupru tribazic în forma cea mai stabilă de cristalizare (BROCANITTA). Conținutul mare de cupru activ, formularea specială, conferă NOVICURE o acțiune fungicidă și bacteriostatică mărită, miscibilitate și stabilitate și rezistență la spălare deosebită.

MOD DE UTILIZARE: Adăugați NOVICURE direct în rezervorul umplut pentru 30% cu apă, menținând agitatorul în funcțiune; apoi adăugați restul cantității de apă necesară preparării volumului de soluție. NOVICURE este omologat în România conform tabelului de mai jos:

Cultura	Agentul dăunător	Doza	Timp de pauză
VIȚĂ DE VIE	<i>Plasmopara viticola</i> (Mana viței de vie), <i>Elsinoe ampelina</i> (Antracnoză), <i>Xylophilus ampelinus</i> (Cancerul viței de vie)	1,4 - 4 kg/ha	21 zile
SEMINȚOASE	<i>Venturia inaequalis</i> (Rapănul mărului), <i>Nectria galigena</i> (Cancerul deschis al ramurilor), <i>Pseudomonas sp.</i> (Cancerul bacterian)	3,5 - 6 kg/ha (tratament de la căderea frunzelor până la apariția mugurilor) 0,75 - 1,25 kg/ha (tratament în vegetație)	21 zile
SÂMBUROASE	<i>Coryneum sp.</i> (Ciuruirea frunzelor), <i>Taphrina deformans</i> (Bășicarea frunzelor de piersci), <i>Pseudomonas sp.</i> (Cancerul bacterian), <i>Xanthomonas campestris</i> (Bacterioză)	6 kg/ha (tratament la căderea frunzelor și la sfârșitul iernii) 1,25 - 1,5 kg/ha (tratament la apariția mugurilor - faza de buton roz)	21 zile
NUC, ALUN	<i>Xanthomonas arboricola</i> (Arsura bacteriană la nuc), <i>Cytospora sp.</i> (Citosporioza alunului)	1,6 - 2,4 kg/ha	14 zile
TOMATE	<i>Phytophthora infestans</i> (Mana tomatelor), <i>Alternaria solani</i> (Alternarioza), <i>Colletotrichum sp.</i> (Antracnoză), <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Pătarea bacteriană), <i>Pseudomonas syringae</i> (Pătarea pustulară a tomatelor)	1,6 - 2,4 kg/ha	3 zile
CARTOF	<i>Phytophthora infestans</i> (Mana cartofului), <i>Alternaria solani</i> (Alternarioza), <i>Colletotrichum sp.</i> (Antracnoză)	1,6 - 1,8 kg/ha	7 zile
CUCURBITACEE (PEPENE GALBEN ȘI VERDE, DOVLEAC, DOVLECEL, CASTRAVETE)	<i>Peronospora cubensis</i> (Mana cucurbitaceelor), <i>Pseudomonas syringae</i> (Cancerul bacterian), <i>Alternaria solani</i> (Alternarioza), <i>Colletotrichum sp.</i> (Antracnoză)	1-4 - 1,8 kg/ha	3 - 7 zile
ANGHINARE	<i>Bremia sp.</i> (Mană), <i>Pseudomonas sp.</i> (Cancerul bacterian), <i>Xanthomonas cynarae</i> (Pătarea bacteriană)	1-4 - 1,8 kg/ha	7 zile
CRUCIFERE (CONOPIDĂ, BROCCOLI, VARZĂ CREATĂ, VARZĂ ALBĂ, VARZĂ ROȘIE, VARZĂ DE CĂPĂȚÂNĂ, VARZĂ CHINEZEASCĂ, VARZĂ DE BRUXELLES, GULII, VARZĂ NEAGRĂ)	<i>Peronospora sp.</i> (Mană), <i>Pseudomonas syringae</i> (Cancerul bacterian), <i>Xanthomonas campestris</i> (Pătarea frunzelor și bășicarea fructelor)	1,4 - 1,8 kg/ha	14 zile
USTUROI, CEAPĂ, PRAZ, HAȘMĂ	<i>Peronospora destructor</i> (Mana cepei), <i>Pseudomonas syringae</i> (Cancerul bacterian)	1,4 - 1,8 kg/ha	14 zile
SALATĂ (CICOARE, ANDIVE, SALATĂ, RIDICHE, RUCOLA, NAP SUEDEZ, FETICĂ)	<i>Bremia lactucae</i> (Mana salatei), <i>Pseudomonas sp.</i> (Cancerul bacterian), <i>Xanthomonas cynarae</i> (Pătarea bacteriană), <i>Pseudomonas cichorii</i> (Pătarea bacteriană), <i>Xanthomonas axonopodis</i>	1,4 - 1,8 kg/ha	7 zile
ALTE LEGUME CU FRUNZE (BUSUIOC, SFECLĂ ELVEȚIANĂ, CARDON, ARPAGIC, FENICUL, PĂTRUNJEL, ȚELINĂ, SPANAC)	<i>Pseudomonas sp.</i> (Cancerul bacterian), <i>Xanthomonas sp.</i> (Pătarea bacteriană), <i>Bremia sp.</i> (Mană)	1,4 - 1,8 kg/ha	14 zile
RĂDĂCINOASE	<i>Alternaria dauci</i> (Alternarioza morcovului), <i>Peronospora crustose</i> (peronosporioza), <i>Cercospora beticola</i> (Cercosporioza sfecliei)	1,4 - 1,8 kg/ha	14 zile
LEGUMINOASE	<i>Xanthomonas axonopodis</i> , <i>Pseudomonas syringae</i> (Cancerul bacterian)	1,4 - 1,8 kg/ha	3 zile
CĂPȘUN	<i>Mycosphaerella fragariae</i> (Pătarea albă), <i>Xanthomonas fragariae</i> (Arsura bacteriană a căpșunului)	1,5 - 2 kg/ha	3 zile
CULTURI FLORICOLE ȘI ORNAMENTALE	<i>Peronospora sp.</i> (Mană), <i>Venturia sp.</i> (Rapăn), <i>Cytospora sp.</i> (Citosporioză), <i>Coniothyrium sp.</i> (cancer), <i>Taphrina deformans</i> (bășicarea frunzelor)		-

Avertisment: în cazul amestecării cu orice alt produs trebuie respectat cel mai lung timp de pauză. De asemenea, trebuie respectate măsurile de precauție prevăzute pentru produsele cele mai toxice. Dacă apar cazuri de intoxicație, informați medicul dumneavoastră cu privire la amestecul realizat.

FITOTOXICITATE: Nu tratați în timpul înfloririi. La piersici, pruni, produsul poate fi fitotoxic dacă este aplicat în plină vegetație, în astfel de cazuri, nu este recomandat pentru utilizarea după o creștere vegetativă completă. Pe soiuri de meri și peri, sensibili la cupru, efectuați teste prealabile:

Soiuri de mere sensibile la cupru: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta de Canada, Roșă Mantovana.

Soiuri de păr sensibil la cupru: Abate Fetei, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

ATENȚIE

- Respectați cu strictețe utilizările și condițiile indicate pe această etichetă;
- Utilizatorul produsului este responsabil pentru eventualele daune rezultate din folosirea necorespunzătoare;
- Respectarea instrucțiunilor de mai sus este esențială pentru a asigura eficacitatea tratamentului și pentru a evita daunele asupra plantelor, oamenilor și animalelor;
- Nu aplicați cu mijloacele aeriene;
- Nu contaminați alte culturi, produse alimentare, băuturi sau cursuri de apă;
- Aplicați în absența vântului;
- Reutilizarea ambalajului golit este interzisă;
- Atenție la soiurile sensibile la cupru.



Resturile de produs rămase neutilizate se păstrează în ambalajele originale, în încăperi destinate în exclusivitate depozitării produselor fitosanitare, conform instrucțiunilor de depozitare. După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele goale se colectează gratuit prin centrele de colectare SCAPA, fiind interzisă utilizarea lor în alte scopuri. Telefonați la 0800.800.211 - apel gratuit sau consultați www.aiprom.ro pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.



Termen de valabilitate:
2 ani de la data fabricației
Lot nr./Data fabricației:
Vezi datele imprimate pe ambalaj

15 KG
AMBALAJ

