

Polyram® DF

Fungicid

Conține: 70% metiram
Etilenbis ditiocarbamat – poli(etilenbis(turam disulfură)) de zinc amoniu
Omologat cu Certificatul de omologare nr. 1369/21.12.1992
Formulare: granule dispersabile în apă

Fraze de pericol:
H 317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H 373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H 410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:
P 260 – Nu inspirați praful.
P 273 – Evitați dispersarea în mediu.
P 280 – Purtați mănuși de protecție.
P 302 + P 352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P 333 + P 313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P 391 – Colectați scurgerile de produs.
P 501 – Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Lot. nr. vezi marcaj pe ambalaj
Data fabricației: vezi marcaj pe ambalaj
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației.
Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării.

Pentru mai multe informații privind produsul, vă rugăm să consultați eticheta și fișa cu date de securitate disponibile pe site-ul BASF: www.agro.basf.ro.
EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
UFI: C4E3-ROVR-Y00V-ESM0
Producător: BASF SE, Germania
Deținător al omologării: BASF SE, Germania
Distribuitor: BASF SRL România
Telefon: (004) 021 5299060

Proprietăți fizico-chimice: Polyram® DF se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă de culoare maro deschis, cu miros moderat de fum.
Mod de acțiune: Polyram® DF este un fungicid pe bază de metiram, din grupa ditiocarbamitilor. Polyram® DF are acțiune prin contact, împiedică germinarea sporilor ciupercilor, având însă efect și asupra dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. Acțiunea sa inițială este foarte rapidă. Este perfect selectiv față de plantele la care se aplică.

Spectrul de activitate și mod de folosire: Polyram® DF se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

		Recomandare aplicare pentru Polyram® DF 1 kg	
		(cantitate apă și suprafață acoperită)*	
CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA	
Cartof	<i>Phytophthora infestans</i> - Mană, <i>Alternaria solani</i> - Pătarea brună	1,8 kg/ha	1 kg / 444 apă / 5556 mp
Ceapă	<i>Peronospora destructor</i> - Mană	0,2 g	1 kg / 500 apă / 6250 mp
Castraveți	<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - Mană	0,2 g	1 kg / 500 apă / 6250 mp
Tomate	<i>Phytophthora infestans</i> - Mană, <i>Septoria lycopersici</i> - Pătarea albă <i>Cladosporium fulvum</i> - Pătarea cafenie, <i>Alternaria spp.</i> - Pătarea brună	0,2 g	1 kg / 500 apă / 6250 mp
Tutun	<i>Peronospora tabacina</i> - Mană	0,2 g	1 kg / 500 apă / 5000 mp
Măr, Păr	<i>Venturia spp.</i> - Rașină	0,25 g	1 kg / 400 apă / 4000 mp
Viță de vie	<i>Plasmopara viticola</i> - Mană	0,2 g	1 kg / 500 apă / 5000 mp
Flori (garoafe)	<i>Uromyces caryophyllinus</i> - Rugină	0,3 g	1 kg / 333 apă / 3333 mp

*se va ține cont și de echipamentul de aplicare pentru calcularea volumului de apă și suprafeței tratate



Atenție

Momentul aplicării: Fiind un fungicid de contact, tratamentele cu fungicidul Polyram® DF se aplică preventiv, respectiv înaintea instalării atacului agentului patogen. În funcție de evoluția condițiilor climatice și a evoluției bolii, tratamentele se repetă la un interval de 10-14 zile, iar dacă este cazul și la intervale mai scurte.

Notă: Se va evita ca soluția de stropit să ajungă pe alte suprafețe sau culturi.

Pregătirea soluției: Se va pregăti înainte de utilizare în cantitatea necesară timpului de lucru. Deși are o bună dispersabilitate în apă, se recomandă agitarea soluției după eventuale pauze. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

Tehnica de aplicare: Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a fungicidelor, utilizate în mod obișnuit la culturile sus menționate. Se vor utiliza dozele specifice aplicării fungicidelor. Volumul de soluție utilizată este în funcție de echipamentul folosit. Se recomandă utilizarea volumului de soluție recomandat pentru fiecare cultură în parte, respectiv pentru cartof și castraveți 600-800 l/ha, tomate 800-1000 l/ha, măr 500-1500 l/ha, păr 500-1000 l/ha, viță de vie și flori 1000 l/ha.

Compatibilitate: Polyram® DF este în general miscibil cu insecticide și fungicide, precum și cu îngrășăminte foliare. Este însă recomandată utilizarea integrală a acestor eventuale amestecuri, imediat după pregătire. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate.

Timp de pauză: Măr, păr - 21 de zile; Tomate - 7-14 zile; Cartof - 14 zile; Viță de vie - 56 de zile; Ceapă - 7 zile, Castraveți - 3 zile.

Curățarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

Măsuri de igienă și protecția muncii:

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajare, semințe sau ambalajele acestora. Măinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautonizate, și în zonele de acces ale animalelor. Consultați medicul dacă nu vă simțiți bine. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

Măsuri de prim ajutor: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar stări de rău consultați un medic. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistență medicală
- după contactul cu pielea: Spălați imediat cu săpun și apă.
- după contactul cu ochii: Spălați ochii afectați, cu plăcăpele deschise, cel puțin 15 minute, sub curent de apă.
- după ingerare: Clătiți imediat gura și apoi beți 200-300 ml de apă, consultați medicul.

Indicați pentru medic: **Antidot:** Nu se cunoaște un antidot specific.
Tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).

Măsuri de protecția mediului: Nu deversați pe sol/în subsol. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu golți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.
SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață.

Condiții de depozitare și transport: Praful poate forma cu aerul un amestec exploziv. Evitați formarea de praf. A se lua măsuri de prevenire împotriva încărcării electrostatice. A se feri de surse de aprindere. A se pune extincătoare la îndemână. Produsul se depozitează în ambalaj original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. A se păstra departe de căldură. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se proteja împotriva umezelii. A se feri de temperaturi mai mari de 30°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipularii, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Număr național pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-15.00); Număr internațional de urgență: +49 180 2273-112.

În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipularii sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Oficiilor Fitosanitare, Județene sau reprezentanței BASF - BASF SRL România, Floreasca Park, Șoseaua Pipera, nr. 43, Corp A, Etaj 1, sector 2, București, Cod poștal: 014254, tel. 021 5299061, fax. 021 5299069.

e 1Kg



©= Marcă înregistrată a firmei BASF

