
Revyflex®

Eliberează-te de grijile provocate de vreme!



Conține
Revysol®

BASF
We create chemistry


Revyflex® - noul T1 de la BASF pentru liniștea ta și a cerealelor tale!

Revyflex®

Substanțe active	66,6 g/L Revysol® (mefentrifluconazol) + 80 g/L piraclostrobin + 100 g/L metrafenonă
Formulare	**EC** - (concentrat emulsionabil)
Doza de aplicare	**0,5 - 1 L/ha**
Moment de aplicare	**T1 (BBCH 30-37)**
Boli combătute	*Oculimacula spp.* - Pătarea în ochi a bazei tulpinii *Zymoseptoria tritici* - Septorioza *Puccinia triticina* - Rugina brună *Puccinia striiformis* - Rugina galbenă *Blumeria graminis* - Făinarea *Pyrenophora tritici-repentis* - Pătarea reticulară a frunzelor de grâu *Pyrenophora teres* - Pătarea reticulară a frunzelor de orz *Rhyncosporium secalis* - Arsura frunzelor *Puccinia hordei* - Rugina orzului
Culturi	**Grâu, orz, secară, triticale**

Profilul produsului

Fungicid specializat pentru combaterea bolilor ce apar în perioada primului tratament (recomandări de aplicare BASF)



*Utilizări minore în România, conform Ordinului 200/2020 al MADR, pentru care nu s-au efectuat teste de eficacitate.

Eliberează-te de grijile provocate de vreme - cu avantajele unice oferite de substanța activă Revysol®

Revysol® – componenta de bază a tratamentelor fungicide la cereale cu beneficii superioare pentru o fermă performantă

01



Fungicid ready-mix,
cu 3 substanțe active ,eficient
împotriva unui spectru larg de boli

Ușor de utilizat



02

Acțiune rapidă și
de lungă durată

Puternic și eficient


03

Rezistență la ploaie, protecție
împotriva razelor UV, performanțe
stabile și selectivitate excelentă,
chiar și la temperaturi scăzute

Încredere maximă






Piraclostrobin contribuie semnificativ la sporul de producție, încă din fazele timpurii de dezvoltare ale culturilor de cereale



Teste efectuate de AAU (Flakkebjerg, DK) 2013 - 2015 (n=5). Producția în martorul netratat = 8.770 kg/ha grâu.

Metrafenona combate excelent făinarea și pătarea în ochi a bazei tulpinii

		Făinarea	Pătarea în ochi
	Germinația sporilor	⊖	⊖
	Infecția	✓	✓
	Creșterea miceliului	✓	✓
	Sporularea	✓	✓

Revyflex® are o formulare de înaltă calitate, optimizată pentru eficacitate maximă

Acțiune preventivă → Acțiune curativă

Metrafenonă

Piraclostrobin


Revysol®


„Acțiune de contact“
Importanța depozitelor de substanță activă la nivel foliar

„Acțiune sistemică“
Importanța absorbției rapide a fungicidului


- Caracteristicile diferite ale substanțelor active au condus la dezvoltarea unei formulări personalizate și optimizate,
- Formularea optimizată oferă protecție completă prin acțiune de contact rapidă și acțiune sistemică garantată de Revysol®,
- Rezultatul este un fungicid performant, cu puterea combinată a 3 substanțe active cu moduri de acțiune diferite.

Revyflex® oferă un efect curativ remarcabil, susținut de molecula Revysol® și de o formulare de înaltă calitate







Revysol®
Chiar și când este aplicat la 9 zile după producerea infecției, efectul sistemic al moleculei Revysol® poate opri dezvoltarea ulterioară a agentului patogen.



Martor netratat
Hifele miceliene de septorioză colonizează interiorul frunzei, provoacă distrugerea celulelor și reduc nivelul procesului de fotosinteză.

Revyflex® oferă o acoperire excelentă pe plantele de cereale





Plante de grâu tratate cu Revyflex® - acoperire vizualizată cu ajutorul unui trasor fluorescent.




Revyflex® - fungicid adaptat noilor condiții climatice

Temperaturile scăzute de la momentul aplicării primului tratament, amplitudinea mare de temperaturi dintre zi și noapte întâlnite în lunile martie și aprilie, dar și vremea instabilă, limitează eficacitatea fungicidelor aplicate.


Performanțe stabile și selectivitate excelentă, chiar și la temperaturi scăzute

Substanța activă Revysol® acționează împotriva agenților patogeni la temperaturi începând cu 5ºC. Revyflex® poate fi, astfel, utilizat pe o perioadă mai lungă de timp, fiind mult mai eficient decât produsele concurente și asigurând o selectivitate excelentă față de cereale.



Teste efectuate între anii 2014 – 2017: Polonia, Germania, Franța, Marea Britanie


Temperaturile scăzute limitează eficacitatea fungicidelor și perioada de aplicare a acestora.



***Aprilie** - temperaturi din timpul zilei de 10.04 în România, media anilor 2017-2019*


Rezistență la ploaie pentru flexibilitate maximă

Datorită formulării de înaltă calitate, Revysol® este absorbit de către plante imediat după aplicare. Revyflex® oferă, astfel, eficacitate ridicată și în condiții de vreme instabilă și ploioasă.




Teste efectuate între anii 2014 – 2017: Polonia, Germania, Franța, Marea Britanie

Revyflex® asigură un spectru larg de combatere a bolilor la cereale păioase



Teste la grâu în câmp, Europa, 2019 - 2023

Revyflex® este soluția inovatoare, eficientă și practică pentru protecția completă a cerealelor în primul tratament






Teste în câmp la grâu: PL, DE, AT, HU, RO, SK (n=27), o aplicare în stadiul BBCH 30 - 37




Revyflex® comparativ cu principalii competitori (împotriva bolilor cu apariție timpurie)

% eficacitate împotriva făinării




Teste în câmp Europa; n=21;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 37;
Evaluare la 19-41 zile de la aplicare;
Martor netratat: 12% severitate atac.






Teste în câmp Germania și Europa de Est; n = 14;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 39;
Evaluare la 19-41 zile de la aplicare;
Martor netratat: 7% severitate atac.

% eficacitate împotriva pătării în ochi



Teste în câmp Europa; n = 15;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 32;
Evaluare în stadiul BBCH 75;
Martor netratat: 39% severitate atac.







Teste în câmp Germania și Europa de Est; n = 18;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 32;
Evaluare în stadiul BBCH 75;
Martor netratat: 33% severitate atac.

Revyflex® comparativ cu principalii competitori (împotriva bolilor foliare)

% eficacitate împotriva septoriozei




Teste în câmp Europa; n = 18;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 37;
Evaluare la 20 - 56 zile de la aplicare;
Martor netratat: 21% severitate atac.





Teste în câmp Germania și Europa de Est; n = 18;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 32;
Evaluare la 20 - 53 zile de la aplicare;
Martor netratat: 15% severitate atac.


% eficacitate împotriva ruginii brune





Teste în câmp PL, DE, NL; n = 4;
O aplicare în stadiul BBCH 31 - 45;
Evaluare la 40 - 65 zile de la aplicare;
Martor netratat: 24% severitate atac.

% eficacitate împotriva pătării reticulare






Teste în câmp Polonia și Germania; n = 3;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 39;
Evaluare la 20 - 33 zile de la aplicare;
Martor netratat: 5% severitate atac;

Revyflex® comparativ cu principalii competitori (rezultate de producție)


Producție grâu (tone/ha)





Teste în câmp Europa; n = 27;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 37.

Producție grâu (tone/ha)






Teste în câmp Germania și Europa de Est;
n = 21;
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 37.




Revyflex® comparativ cu principalii competitori. **Performanțe superioare** și la cultura de orz

% eficacitate pătarea reticulară a frunzelor de orz



Teste în câmp 2021; n = 3 (PL);
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 31;
Evaluare la 50 - 55 zile de la aplicare;
Martor netratat: 17% severitatea atacului.


% Eficacitate rugina orzului





Teste în câmp 2020; n = 3 (PL, RO);
O aplicare în stadiul BBCH 30 - 37;
Evaluare la 32 - 51 zile de la aplicare;
Martor netratat: 15% severitatea atacului.

Producție orz (tone/ha)





Teste în câmp 2020; n = 5 (PL, RO, DE)

BASF SRL
Floreasca Park, Șos. Pipera nr. 43,
Corp A, Etaj 1, Sector 2, 014254 - București
T: 021 529 90 00
www.agro.basf.ro

Ne poți urmări și aici:

Fii un fermier informat!
Vrei sa fii primul care află despre ofertele noastre speciale, evenimentele, recomadările agricole sau noile produse lansate pentru a crește profitabilitatea culturilor tale?

Scanează codul QR de mai jos pentru a te abona la informările BASF!

Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de folosirea informațiilor din această broșură.