
Tehnologia de protecție a culturii mărului

Problemă	Soluție
Făinare - *Podosphaera leucotricha*	**Kumulus® DF** 4,5 kg/ha — **Kumulus® DF** 4,5 kg/ha
Rapăn - *Venturia inaequalis*	**Scala®** 0,75 – 1 L/ha; **Delan® Pro** 2,5 L/ha — **Delan® Pro** 2,5 L/ha; **Sercadis®*** 0,25 - 0,3 L/ha
Rapăn - *Venturia inaequalis* + Făinare - *Podosphaera leucotricha*	**Dagonis®** 0,7 L/10.000 m² LWA (Max. 1,2 L/ha); **Revyona®** 1,3 L/10.000 m² LWA (Max. 2 L/ha); **Bellis®** 0,8 kg/ha
Boli de depozitare	**Bellis®** 0,8 kg/ha
Regulator de creștere, Focul bacterian - *Erwinia amylovora*	**Regalis® Plus** 2,5 - 3 kg/ha (AgCelence Dincolo de așteptări)



*Pentru a evita apariția formelor de rezistență în combaterea rapănului: Sercadis® - 0,25 L/ha, împreună cu un fungicid care are și acțiune de contact, de ex. Delan® Pro.

Timp de pauză până la recoltat: Delan® Pro - 35 zile | Sercadis® - 35 zile | Dagonis® - 35 zile | Scala® - 7 zile | Bellis® - 7 zile | Revyona® - 28 zile